


Consejo de Supervivencia 37 (2da parte)
Animales Ponzofiosos México (Víperos)



Grado de Envenenamiento	Síntomas y Signos	Niños		Adultos	
		Dosis Inicial	Dosis de Sostén	Dosis Inicial	Dosis de Sostén
Grado 0 Sospecha	Antecedente de haber sido mordido recientemente por serpiente, huellas de colmillos y dolor local.	Observación		Observación	
Grado 1 Leve	<ul style="list-style-type: none"> Signos y síntomas de Grado 0. Hemorragia por orificios de la mordedura. Dolor alrededor del área mordida. Edema (inflamación) de hasta 10cm de diámetro en el miembro afectado. 	6 a 10 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	5 frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.	3 a 5 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	5 frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.
Grado 2 Moderado	<ul style="list-style-type: none"> Acentuación de síntomas y signos de Grado 1. Edema (inflamación) de 10cm o más del área del miembro afectado. Náusea. Vómito. Flictenas (ampollas) con contenido seroso o sanguinolento. Oliguria (disminución de producción de orina) leve. CPK, creatinina sérica, tiempo de coagulación, protrombina y tromboplastina elevadas. Hipofibrinogenemia, trombocitopenia y gases arteriales, alterados. 	15 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	5 frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.	6 a 10 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	5 frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.
Grado 3 Severo	<ul style="list-style-type: none"> Acentuación de síntomas y signos del Grado 2. Tejido necrosado (muerto) en el miembro o área mordida. Dolor abdominal. Bulas (burbujas). Mionecrosis (gangrena gaseosa). Parestesias (adormecimiento, hormigueo). Oliguria (baja producción de orina) marcada. Hemorragia vía bucal y/o rectal. Hemoptisis (expectoración sanguinolenta). Hematuria (orina con sangre). Pruebas de laboratorio muy alteradas. 	20 a 30 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	10 a 15 frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.	11 a 15 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	6 a 8 frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.
Grado 4 Muy Severo Crítico	<ul style="list-style-type: none"> Acentuación de síntomas y signos del Grado 3. Shock. Disfunción orgánica múltiple. Coma. 	31 a más frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	16 a más frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.	16 a más frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.	8 a más frascos por venoclisis a 500ml Solución Salina para cada 4hrs.