

Grado de Envenenamiento	Síntomas y Signos	Niños		Adultos	
		Dosis Inicial	Dosis de Sostén	Dosis Inicial	Dosis de Sostén
<b>Grado 1</b>  <b>Leve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antecedente de haber sido mordido recientemente por serpiente.</li> <li>• Huellas de colmillos.</li> <li>• Dolor local.</li> <li>• Edema (inflamación).</li> <li>• Hemorragia por los orificios de la mordedura.</li> <li>• Parestesias (adormecimiento, hormigueo) en el miembro afectado o el área mordida.</li> </ul>	<b>2 a 3 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>3 a más frascos Intravenos o directo y lento, o por venoclisis</b>	<b>2 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>2 a más frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>
<b>Grado 2</b>  <b>Moderado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acentuación de signos y síntomas de Grado 1, en el transcurso de 30 a 120 minutos y hasta 15 horas posteriores a la mordida.</li> <li>• Edema (inflamación) progresivo.</li> <li>• Astenia (sensación de fatiga, cansancio).</li> <li>• Adinamia (falta de fuerza, movimiento, o reacción).</li> <li>• Ptosis Palpebral (párpado superior caído).</li> <li>• Oftalmoplejía (incapacidad de mover voluntariamente el globo ocular).</li> <li>• Visión borrosa.</li> <li>• Diplopia (Visión doble).</li> <li>• Disnea (dificultad para respirar).</li> </ul>	<b>5 a 6 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>6 a más frascos Intravenos o directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>5 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>5 a más frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>
<b>Grado 3</b>  <b>Severo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acentuación de signos y síntomas del Grado 2.</li> <li>• Ataxia (desequilibrio).</li> <li>• Trismus (dolor, rigidez y /o espasmo de la mandíbula).</li> <li>• Disfagia (problemas para tragar).</li> <li>• Sialorrea (salivación excesiva).</li> <li>• Voz débil.</li> <li>• Hiporeflexia (ausencia de reflejos).</li> <li>• Parálisis flácida (músculo laxo y blando).</li> <li>• Disnea (dificultad para respirar) marcada con progresión a Paro Respiratorio.</li> <li>• Coma.</li> </ul>	<b>8 a 9 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>9 a más frascos Intravenos o directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>8 frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>	<b>8 a más frascos Intravenoso directo y lento, o por venoclisis.</b>