

Consejo de Supervivencia. No 40

Animales Ponzñosos en México:

Continuando con el tema de “**Arácnidos Ponzñosos**”, abordamos ahora los Síntomas y Signos, así como el Tratamiento en base a la fase o grado de afectación que presente el paciente, por mordedura de las siguientes araña: Latrodectus (llamada Viuda Negra, Capulina, etc.). **Anti-Veneno: Aracmyn Plus**

Grado de Envenenamiento	Síntomas y Signos	Grupo de edad	Aracmyn Plus Dosis
Grado 1 Leve	<ul style="list-style-type: none"> Dolor en el sitio de la mordedura. Dolor de intensidad variable localizado en extremidades inferiores, región lumbar o abdomen, en los 3 sitios. Diaforesis (sudoración excesiva). Sialorrea (salivación excesiva). Astenia (sensación de fatiga o cansancio). Adinamia (falta de fuerza, movimiento, o reacción). Mareo. Hiperreflexia (reflejos exagerados). 	Todas las edades	Inicial: 1. 1 frasco Intravenoso directo y lento. 2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 3. Si no hay remisión, repetir dosis cada hora.
		Grado 2 Moderado	<ul style="list-style-type: none"> Acentuación de síntomas y signos del grado Leve. Disnea (dificultad para respirar). Lagrimo. Cefálea (dolor de cabeza). Opresión torácica (dolor en el pecho). Rigidez en las extremidades. Espasmos y/o contracturas musculares. Priapismo (erección dolorosa y constante).
Grado 3 Severo	<ul style="list-style-type: none"> Acentuación de síntomas y signos del grado Moderado. Midriasis (pupilas dilatadas) o Miosis (pupila contraída). Trismus (dolor, rigidez y/o espasmo de mandíbula). Confusión. Delirio. Alucinaciones. Retención Urinaria. Arritmia cardiaca. Taquicardia (FC arriba de 100ppm en reposo) o Bradicardia (FC debajo de 60ppm en reposo). Broncoconstricción (estrechamiento de vías aéreas). Rigidez muscular generalizada. 		Mayor de 15 años
		Menor de 15 años	Inicial: 1. 3 frascos Intravenoso directo y lento. 2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 3. Si no hay remisión, repetir dosis cada hora.
		Mayor de 15 años	Inicial: 1. 2 a 3 frascos Intravenoso directo y lento. 2. Remisión promedio 90 a 120 mins. 3. Si no hay remisión, repetir dosis cada hora.

Fuente: Instituto Bioclon (Julio 2010) www.redtox.org Dr. Alfredo Luis Chávez Haro (Arácnidos)

Para obtener los Antivenenos (Faboterápicos): 01 800 0038 600 / D.F. 55 75 40 16

<http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html>

Hoja 1/1

www.sierraventuramex.com tel. (442) 1 82 48 76