

## Consejo de Supervivencia. No 41

### Animales Ponzofiosos en México:

Continuando con el tema de “**Arácnidos Ponzofiosos**”, abordamos ahora los Síntomas y Signos, así como el Tratamiento en base a la fase o grado de afectación que presente el paciente, por picaduras de alacrán “Centruroides”.

**Anti-Veneno:** Alacramyn

Grado de Envenenamiento	Síntomas y Signos	Grupo de edad	Alacramyn Dosis
<b>Grado 1</b>  <b>Leve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dolor en el sitio de la picadura.</li> <li>Parestesia (adormecimiento, hormigueo) local.</li> <li>Prurito (comezón, picazón) nasal.</li> </ul>	<b>Todas las edades</b>	<b>Inicial:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 frasco Intravenoso directo y lento.</li> <li>Remisión promedio 30 a 60 mins.</li> <li>Si no hay remisión, repetir dosis cada 30 minutos.</li> </ol>
<b>Grado 2</b>  <b>Moderado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acentuación de síntomas y signos del Grado 1.</li> <li>Sialorrea (salivación excesiva)</li> <li>Parestesia (adormecimiento, hormigueo) general.</li> <li>Inquietud.</li> <li>Distensión abdominal (abultamiento del abdomen).</li> <li>Fasciculaciones linguales (contracciones musculares en la lengua).</li> <li>Disnea (dificultad para respirar).</li> <li>Dolor retroesternal (dentro del tórax, debajo del esternón)</li> </ul>	<b>Menor de 15 años</b>	<b>Inicial:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 frascos Intravenoso directo y lento.</li> <li>Remisión promedio 30 a 60 mins.</li> <li>Si no hay remisión, repetir dosis cada 30 minutos.</li> </ol>
		<b>Mayor de 15 años</b>	<b>Inicial:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 frasco Intravenoso directo y lento.</li> <li>Remisión promedio 30 a 60 mins.</li> <li>Si no hay remisión, repetir dosis cada 30 minutos.</li> </ol>
<b>Grado 3</b>  <b>Severo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acentuación de síntomas y signos del Grado 2.</li> <li>Sensación de cuerpo extraño en garganta (cabellos).</li> <li>Nistagmus (movimientos involuntarios de los ojos).</li> <li>Convulsiones.</li> <li>Vómito frecuente.</li> <li>Marcha atáxica (desequilibrio).</li> <li>Ceguera transitoria.</li> <li>Hipertensión arterial.</li> <li>Priapismo (erección dolorosa y constante).</li> <li>Molestia vaginal.</li> <li>Edema agudo pulmonar (líquido en pulmones).</li> </ul>	<b>Menor de 15 años</b>	<b>Inicial:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 frascos Intravenoso directo y lento.</li> <li>Remisión promedio 30 a 60 mins.</li> <li>Si no hay remisión, repetir dosis cada 30 minutos.</li> </ol>
		<b>Mayor de 15 años</b>	<b>Inicial:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 frasco Intravenoso directo y lento.</li> <li>Remisión promedio 30 a 60 mins.</li> <li>Si no hay remisión, repetir dosis cada 30 minutos.</li> </ol>

Fuente: Instituto Bioclon (Julio 2010) [www.redtox.org](http://www.redtox.org) Dr. Alfredo Luis Chávez Haro (Arácnidos)  
 Para obtener los Antivenenos (Faboterápicos): 01 800 0038 600 / D.F. 55 75 40 16  
<http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html>